

Колоноскопия под анестезией

Обязательные условия соблюдения режима до и после операционного периода

До операции:

Подготовка кишечника является одним из важнейших факторов успешного проведения эндоскопического исследования, результатом которого является точный диагноз.

Для качественной подготовки кишечника Вам необходимо:

1. **За 3-е суток** до исследования – строгое соблюдение бесшлаковой диеты:

РАЗРЕШЕНО	ЗАПРЕЩЕНО
Вся белковая пища: • Отварное мясо и птица; яйца и сыр; • Кисломолочные продукты; • Сахар и мёд; • Нежирная рыба; Жидкости прозрачные негазированные: • Прозрачные бульоны; • Чай и кофе; • Компоты без ягод; сок без мякоти; • Негазированная вода.	Вся растительная пища: • Овощи, фрукты, ягоды, семечки, орехи, зелень; • Крупнозерновой и чёрный хлеб; • Крупы и каши; Жидкости: • Окрашенные соки с мякотью; • Алкоголь; • Газированные напитки; *Вся пища и жидкости, не входящие в список разрешённых.

2. **За 3 суток** до исследования исключить препараты железа

3. **За сутки** до исследования запрещается употребление любой пищи, молочных, кисломолочных, хлебобулочных продуктов. Необходимо употребление жидкости не менее 3 литров: минеральная вода без газа, чай, компот, соки без мякоти, прозрачные бульоны.

Непосредственная очистка кишечника с помощью рекомендуемых лекарственных препаратов:

Мовипреп. Для приготовления 1 литра раствора препарата содержимое одного саше А и одного саше Б растворить в 1 литре негазированной воды. Для приготовления двух литров раствора препарата, содержимое оставшихся – второго саше А и второго саше Б растворить в одном литре воды. Общая доза составляет 2 литра раствора, который следует выпить с 17.00 до 19.00 накануне вечером. Рекомендуется дополнительно употребить 1 литр другой жидкости (вода, бульон, фруктовый сок без мякоти, безалкогольные напитки, чай, кофе без молока). У раствора препарата приятный вкус. Без клизм.

Пикопреп. Содержимое первого пакета принимают после обеда или ранним вечером (с 16 до 18 часов), запивая не менее 5 стаканами по 250 мл. воды. Содержимое второго пакетика принимают на ночь (22-24 часа), запивая не менее 3 стаканами по 250 мл. воды. Без клизм.

Фортранс. Дозу препарата рассчитывают исходя из соотношения 1 литр на 15-20 кг массы тела пациента или, в среднем, от 3 до 4 литров полученного раствора. Объем раствора препарата ФОРТРАНС® нельзя уменьшать! Вся доза (3-4 литра раствора) препарата ФОРТРАНС® принимается ОДНОЭТАПНО накануне вечером. Выпить раствор следует порционно с 17.00 до 19.00. часов. В раствор можно добавить сок одного лимона. При сомнении в полном опорожнении кишечника утром в день обследования сделать 1-2 очистительные клизмы.

Эзиклен. Вечером накануне процедуры (например, в 18:00) содержимое одного флакона препарата следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л). В течение последующих двух часов пациент должен выпить полученный раствор и дополнительно два мерных стакана воды или прозрачной жидкости (т.е. около 1 л). Приблизительно через 2 ч после начала приема первой дозы содержимое второго флакона препарата следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л). В течение последующих двух часов пациент должен выпить полученный раствор и дополнительно два мерных стакана воды или прозрачной жидкости (т.е. около 1 л). Без клизм.

Список анализов, необходимых для проведения колоноскопии под анестезией.

1. Анализ крови на гепатиты В и С, методом ИФА.
2. Группа крови, резус фактор
3. Клинический анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты)
4. Биохимический анализ крови: глюкоза, мочевины, креатинин
5. ЭКГ
6. Консультация кардиолога при изменениях на ЭКГ
7. Паспорт

В день исследования подходить строго натощак к 11:00:

- 9 корпус, 1 этаж, эндоскопическое отделение, колоноскопический кабинет (для оценки подготовки пациента к исследованию)
- кабинет колопроктолога (для получения электронного направления)
- приёмное отделение (для оформления медицинской карты)
- колопроктологическое отделение (осмотр врача-колопроктолога и наблюдение пациента после исследования).

Колоноскопия под анестезией проводится ориентировочно с **13.00 часов**. Оплата производится в кассе 9 корпус 1 этаж перед исследованием. Заключение колоноскопии выдаётся в 2-х экземплярах.

После операции:

1. В целях обеспечения безопасности пациента, которому в амбулаторных условиях была проведена **анестезия, отличная от местной анестезии**, пациенту надлежит выписываться домой только в сопровождении взрослого (совершеннолетнего) дееспособного лица. (согласно методическим рекомендациям «Анестезиологическое обеспечение взрослых пациентов в амбулаторных условиях», утвержденных Министерством здравоохранения РФ в 2023 г.)

2. Категорически запрещается управление любым транспортным средством в течение суток после операции, а также принятие важных решений, в том числе связанных с опасной рабочей деятельностью. (согласно методическим рекомендациям «Анестезиологическое обеспечение взрослых пациентов в амбулаторных условиях», утвержденных Министерством здравоохранения РФ в 2023 г.)