

Проведение колоноскопии под анестезией

Проведение колоноскопии под анестезией для амбулаторных пациентов

№ п/п	Наименование услуги	Ед.изм.	Цена, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
6.4.2	Видеоколоноскопия	1 исследование	2 000	1	2 000,00
1.31	Прием врача высшей категории (консультация врача-анестезиолога)	1 прием	265	1	265,00
30.9	Аппаратно-масочный наркоз по отделениям стационара	1 случай наркоза	1 830	1	1 830,00
1.2.67	Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога	1 консультация	740	1	740,00
34.2	Индивидуальный пост медицинского наблюдения за час работы с обеспечением средним медицинским персоналом (в дневное время)	час	224	6	1 344,00
ИТОГО					6 179,00

Проведение колоноскопии под анестезией для пациентов стационара

№ п/п	Наименование услуги	Ед.изм.	Цена, руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1.31	Прием врача высшей категории (консультация врача-анестезиолога)	1 прием	265	1	265,00
30.9	Аппаратно-масочный наркоз по отделениям стационара	1 случай наркоза	1 830	1	1 830,00
34.2	Индивидуальный пост медицинского наблюдения за час работы с обеспечением средним медицинским персоналом (в дневное время)	час	224	6	1 344,00
ИТОГО					3 439,00

Запись осуществляется через единую справочную по телефону: **+7 (4722) 73-20-92**

Получить дополнительную информацию Вы можете по телефону: **+7 (4722) 50-47-27**

Приложение № 1

к договору на оказание платных медицинских услуг -
«колоноскопия под анестезией»

от «___» _____ 20__ г.

№ _____

Обязательные условия соблюдения режима до и после операционного периода

До операции:

1. Соблюдение схемы подготовки к колоноскопии.
 - 1.1. За сутки до исследования запрещается употребление пищи.
 - 1.2. Разрешается употребление жидкости: минеральная вода без газа, чай, компот, соки без мякоти, прозрачные бульоны. Объем выпитой жидкости не менее 3 литров.
2. Рекомендуемые лекарственные препараты:

Мовипреп.

Для приготовления 1 литра раствора препарата содержимое одного саше А и одного саше Б растворить в 1 литре негазированной воды. Для приготовления двух литров раствора препарата, содержимое оставшихся – второго саше А и второго саше Б растворить в одном литре воды. Общая доза составляет 2 литра раствора, который следует выпить с 17.00 до 19.00 накануне вечером. Рекомендуется дополнительно употребить 1 литр другой жидкости (вода, бульон, фруктовый сок без мякоти, безалкогольные напитки, чай, кофе без молока). У раствора препарата приятный вкус. Без клизм.

Пикопреп.

Содержимое первого пакета принимают после обеда или ранним вечером (с 16 до 18 часов), запивая не менее 5 стаканами по 250 мл. воды. Содержимое второго пакетика принимают на ночь (22-24 часа), запивая не менее 3 стаканами по 250 мл. воды. Без клизм.

Фортранс.

Накануне исследования 3 пакетика препарата развести в 3 литрах негазированной воды. Растворить и выпить порционно с 17.00 до 19.00. В раствор можно добавить сок одного лимона. При сомнении в полном опорожнении кишечника утром в день обследования сделать 1-2 очистительные клизмы.

Эзиклен

Вечером накануне процедуры (например, в 18:00) содержимое одного флакона препарата следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л). В течение последующих двух часов пациент должен выпить полученный раствор и дополнительно два мерных стакана воды или прозрачной жидкости (т.е. около 1 л).

Приблизительно через 2 ч после начала приема первой дозы содержимое второго флакона препарата следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л). В течение последующих двух часов пациент должен выпить полученный раствор и дополнительно два мерных стакана воды или прозрачной жидкости (т.е. около 1 л). Без клизм.

Список анализов, необходимых для проведения процедуры под анестезией.

1. Анализ крови на гепатиты В и С, методом ИФА.
2. Группа крови, резус фактор
3. Клинический анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты)
4. Биохимический анализ крови: глюкоза, мочевины, креатинин
5. ЭКГ
6. Консультация кардиолога при изменениях на ЭКГ
7. Паспорт
8. Анализ на Covid19.

(подходить в колопроктологическое отделение к 12.00 час., исследование – в 13.00 час., оплата перед исследованием, заключение колоноскопии в 2-х экземплярах).

После операции:

1. В целях обеспечения безопасности пациента, которому в амбулаторных условиях была проведена анестезия, отличная от местной анестезии, пациенту надлежит выписываться домой только в сопровождении взрослого (совершеннолетнего) дееспособного лица. (согласно методическим рекомендациям «Анестезиологическое обеспечение взрослых пациентов в амбулаторных условиях», утвержденных Министерством здравоохранения РФ в 2023 г.)
2. Категорически запрещается управление любым транспортным средством в течение суток после операции, а также принятие важных решений, в том числе связанных с опасной рабочей деятельностью. (согласно методическим рекомендациям «Анестезиологическое обеспечение взрослых пациентов в амбулаторных условиях», утвержденных Министерством здравоохранения РФ в 2023 г.)

От Исполнителя

От Заказчика/Потребителя/

_____ **Дмитракова М.Н.**

_____ / _____ /

**Подпись
расшифровка подписи**

Врач анестезиолог-реаниматолог

_____ **/Лепетюхин Р.А./**